

Autores

1. Rojas, D. 2. Belmar, JM. 3. Rodríguez, C. 4. Ballesteros, J. 5. Clavo, P. 6. García, S. 7. Del Corral, S. 8. Jerez, N. 9. Neila, MA. 10. Del Romero, J.

Centros de trabajo

Centro Sanitario Sandoval. Madrid.

Título

DESCRIPCIÓN DE LOS SEROCONVERTORES RECIENTES AL VIH EN UN CENTRO DE ITS/VIH DE MADRID (2000-2005)

Abstract

Objetivo: Describir el perfil de las personas recientemente infectadas por el VIH (seroconvertores recientes) entre 2000-2005.

Material y métodos: Estudio transversal de 107 seroconvertores al VIH identificados en un centro de ITS/VIH de Madrid (2000-2005). Todos ellos contestaron un cuestionario estructurado que permitía ofrecer consejo preventivo individualizado.

Resultados: El 96.3% eran hombres y el 3.7% mujeres, la edad media fue 32.7 años. En el 98.1% de los casos la vía de transmisión fue la sexual (101 HSH y 4 heterosexuales), sólo 2 pacientes refirieron la vía parenteral como vía más probable de transmisión. El tiempo medio transcurrido entre la última prueba negativa y la seroconversión fue 11.8 meses.

El 74.5% eran españoles, el 17.9% latinoamericanos, el 5.6% europeos y el 2% tenían otro origen.

La edad media de la primera relación sexual fue 17.7 años [rango 8-33], el número medio de parejas sexuales vida fue 240 [rango 2-2.500].

El 66% de los coitos anales en HSH en los últimos 6 meses eran desprotegidos, mientras que todas las prácticas sexuales de los heterosexuales (anales y vaginales) eran desprotegidas. Un 50% de aquellos que tenían pareja estable sabía que ésta era seropositiva, y un 28.8% desconocía la serología de dicha pareja.

Un 94.4% de los pacientes tenía pruebas previas negativas documentadas (Media: 5.43; Mdn: 4), y un 20.6% tenía un Western-Blot indeterminado. Un 67.3% tenía antecedentes de ITS.

Un 52.8% refirió haber consumido drogas recientemente, siendo las más frecuentes cocaína, poppers y éxtasis.

El subtipo genético del VIH-1 más frecuente fue el B (61.9%). La mediana de la carga viral era 44.792 y del recuento de CD4 era 641. Un 99.1% se encontraba asintomático y un 2.9% presentaba coinfección por el VHC.

Conclusiones: La descripción de cofactores asociados a las nuevas infecciones permite dirigir la atención hacia aspectos que no han sido suficientemente considerados hasta la actualidad (pareja estable, consumo de drogas).